

## Matematikai statisztika (2. előadás)

**Statisztikai minta:**  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók (azaz: valószínűségi vektorváltozó).

Mintaelemszám:  $n$

A minta **független**, ha az  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók függetlenek (például ha a megkérdezetteket függetlenül választottuk, vagy ha a mérések nem befolyásolják egymást), azaz

$$\mathbb{P}(X_1 \leq t_1, X_2 \leq t_2, \dots, X_n \leq t_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq t_1) \cdot \mathbb{P}(X_2 \leq t_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq t_n)$$

teljesül tetszőleges  $t_1, t_2, \dots, t_n$  valós számok esetén.

Az  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók azonos eloszlásúak, de **eloszlásuk nem ismert**: nem tudjuk, hogy mennyi  $\mathbb{P}(X_1 \leq t)$ , mennyi  $X_1$  várható értéke, szórása, vagy hogy két mennyiség között milyen erős a korreláció. A cél az adatok alapján

- a valószínűségi változók eloszlásának minél jobb megismerése
- a várható érték, szórás stb. becslése
- az eloszlásra vonatkozó hipotézisek eldöntése
- több valószínűségi változó együttes viselkedésének leírása

# Házi feladat február 18., kedd, 10:15-ig

Kérdezzünk meg legalább 40 ismerőst az alábbiakról:

- 1 egy tipikus hétköznapon átlagosan mennyi időt tölt sorozatnézéssel (percben)
- 2 egy tipikus hétköznapon átlagosan mennyi időt tölt utazással percben)
- 3 hetente hány alkalommal sportol legalább fél órát
- 4 hetente átlagosan hányszor megy be az iskolásba/egyetemre/munkahelyére
- 5 tanul-e valamilyen intézményben
- 6 van-e valamilyen munkaviszonya (dolgozik-e)


a) Készítsünk hisztogramot az utazással töltött időről. b) Készítsük el a sorozatnézéssel töltött idő tapasztalati eloszlásfüggvényét külön-külön azoknál, akik tanulnak, és akik nem tanulnak. Milyen következtetést vonhatunk le az ábrából?

**Az adatokra az egész félév során szükség lesz a házi feladatok megoldásához.**

## Házi feladat február 18., kedd, 10:15-ig

```
> install.packages("readxl")  
> library(readxl)  
> adatok <- read_excel("sstadatn.xlsx")  
> utazas <- adatok$utazas  
  
> plot(ecdf(utazas), col="blue", lwd="3", main="", xlab="idő (perc)",  
ylab="F(t)")
```

# Házi feladat február 18., kedd, 10:15-ig




Az utazási idő tapasztalati eloszlásfüggvénye az adatok javítása után

## Házi feladat február 18., kedd, 10:15-ig


```
sorozat <- adatok$sorozat  
  
plot(ecdf(sorozat[adatok$tanulas=="Igen"]), col="red", lwd="3", main="Igen",  
xlab="idő (perc)", ylab="F(t)")  
  
lines(ecdf(sorozat[adatok$tanulas=="Nem"]), col="blue", lwd="3")  
  
legend("bottomright", c("tanul", "nem tanul"), col=c("red", "blue"),  
lwd="3")
```

# Házi feladat február 18., kedd, 10:15-ig



A tanulók és nem tanulók sorozatnézéssel töltött idejének tapasztalati eloszlásfüggvénye

## Házi feladat február 18., kedd, 10:15-ig



A tanulók és nem tanulók sorozatnézéssel töltött idejének tapasztalati eloszlásfüggvénye

A tanulók közül többen vannak, akik egyáltalán nem néznek sorozatot, vagy kevesebb időt töltenek ezzel, de a legtöbb időt sorozatnézéssel töltők közül szintén sokan tanulnak

## Középértékek: medián

Minta:  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ , mintaelemszám:  $n$ .

### Definíció (medián)

Ha  $n$  páratlan: a rendezett minta középső,  $(n+1)/2$ . elemét, azaz  $X_{(n+1)/2}^*$ -t a minta **mediánjának** nevezzük.

Ha  $n$  páros: a rendezett minta  $n/2$ . és  $n/2 + 1$ . elemének átlagát, azaz a

$$\frac{X_{n/2}^* + X_{n/2+1}^*}{2}$$

mennyiséget a minta mediánjának nevezzük.

Megjegyzés: páros  $n$  esetén a teljes  $[X_{n/2}^*, X_{n/2+1}^*]$  intervallumot (vagy annak bármely elemét) is a minta mediánjának lehet hívni.

**Példa:** a Duna vízállásáról kapott húszelemű minta mediánja:

$$\frac{1}{2}(X_{10}^* + X_{11}^*) = \frac{1}{2}(135 + 148) = 141,5.$$

# Középértékek: az átlag és a medián összehasonlítása

## Normális eloszlás

500 elemű független minta:  $X_1, X_2, \dots, X_{500}$  függetlenek, eloszlásuk normális eloszlás  $m = 1$  várható értékkel és  $\sigma = 1$  szórással

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-1.9840	0.2847	<b>0.9842</b>	<b>0.9863</b>	1.6930	3.6110

## Exponenciális eloszlás


500 elemű független minta:  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{500}$  függetlenek, eloszlásuk exponenciális eloszlás  $\lambda = 1$  paraméterrel.  $\mathbb{E}(Y_k) = 1$  és  $D(Y_k) = 1$  minden  $k = 1, 2, \dots, 500$ -ra.

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.001326	0.282700	<b>0.637300</b>	<b>0.984900</b>	1.349000	5.895000

```
exp=rexp(n=500, rate=1)
```


```
summary(exp)
```

# A normális eloszlású minta hisztogramja



# Az exponenciális eloszlású minta hisztogramja

**Exponenciális eloszlás**



# Az átlag és a medián összehasonlítása

## Az átlag

- "több információt használ"
- érzékenyebb a kiugró adatokra, azaz egy hibás mérés is könnyen megváltoztathatja
- nem szimmetrikus esetben eltérhet a leggyakrabban megfigyelt értékektől

## A mediánt is érdemes használni, ha

- vannak kiugró (esetleg hibás) adatok;
- ha az eloszlás nem szimmetrikus, és az átlag és a medián jelentősen különbözik (mint a fenti példában az exponenciális eloszlás esetén).

## Középértékek közelítése osztályközös gyakoriságokkal

Tegyük fel, hogy az adatokat nem ismerjük pontosan, csak a hisztogramot, vagyis hogy az egyes osztályokba, intervallumokba hány megfigyelés esik. Legyen  $x_j$  a  $j$ . osztályközép (az alsó és felső határ átlaga), és  $f_j$  a  $j$ . osztályba eső megfigyelések száma, továbbá  $n = f_1 + f_2 + \dots + f_k$  az összes megfigyelés száma. Ekkor

- az átlag közelítése:

$$\frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_k x_k}{n};$$

# Középértékek közelítése osztályközös gyakoriságokkal

Tegyük fel, hogy az adatokat nem ismerjük pontosan, csak a hisztogramot, vagyis hogy az egyes osztályokba, intervallumokba hány megfigyelés esik. Legyen  $x_j$  a  $j$ . osztályközép (az alsó és felső határ átlaga), és  $f_j$  a  $j$ . osztályba eső megfigyelések száma, továbbá  $n = f_1 + f_2 + \dots + f_k$  az összes megfigyelés száma. Ekkor

- az átlag közelítése:

$$\frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_k x_k}{n};$$

- a medián közelítése:

$$t_{\text{me}} + \frac{n/2 - F_{\text{me}-1}}{f_{\text{me}}} \cdot h_{\text{me}},$$

ahol  $t_{\text{me}}$  a mediánt tartalmazó osztály alsó határa,  $F_{\text{me}-1}$  a mediánt tartalmazó osztályt megelőző osztályok gyakoriságainak összege,  $f_{\text{me}}$  a mediánt tartalmazó osztály gyakorisága,  $h_{\text{me}}$  a mediánt tartalmazó osztály szélessége.

# Matematikai statisztika

A mintavétel eredményeként kapott adatok véletlenek: véletlenszerűen választjuk a megkérdezetteket, mérési hibát követünk el stb. A kísérlet megismétlésénél más eredményeket kapnánk.

**Statisztikai minta:**  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók (azaz: valószínűségi vektorváltozó).

Mintaelemszám:  $n$

# Matematikai statisztika

A mintavétel eredményeként kapott adatok véletlenek: véletlenszerűen választjuk a megkérdezetteket, mérési hibát követünk el stb. A kísérlet megismétlésénél más eredményeket kapnánk.

**Statisztikai minta:**  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók (azaz: valószínűségi vektorváltozó).

Mintaelemszám:  $n$

A minta **független**, ha az  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók függetlenek (például ha a megkérdezetteket függetlenül választottuk, vagy ha a mérések nem befolyásolják egymást), azaz

$$\mathbb{P}(X_1 \leq t_1, X_2 \leq t_2, \dots, X_n \leq t_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq t_1) \cdot \mathbb{P}(X_2 \leq t_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq t_n)$$

teljesül tetszőleges  $t_1, t_2, \dots, t_n$  valós számok esetén.

# Matematikai statisztika

A mintavétel eredményeként kapott adatok véletlenek: véletlenszerűen választjuk a megkérdezetteket, mérési hibát követünk el stb. A kísérlet megismétlésénél más eredményeket kapnánk.

**Statisztikai minta:**  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók (azaz: valószínűségi vektorváltozó).

Mintaelemszám:  $n$


A minta **független**, ha az  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók függetlenek (például ha a megkérdezetteket függetlenül választottuk, vagy ha a mérések nem befolyásolják egymást), azaz

$$\mathbb{P}(X_1 \leq t_1, X_2 \leq t_2, \dots, X_n \leq t_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq t_1) \cdot \mathbb{P}(X_2 \leq t_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq t_n)$$

teljesül tetszőleges  $t_1, t_2, \dots, t_n$  valós számok esetén.

Az  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  valószínűségi változók **eloszlása nem ismert**: nem tudjuk, hogy mennyi  $\mathbb{P}(X_1 \leq t)$ , vagy mennyi  $X_1$  várható értéke, szórása. A cél a valószínűségi változók eloszlásának a becslése, rá vonatkozó hipotézisek eldöntése a megfigyelések, vagyis az adatok alapján.

# Hisztogram és sűrűségfüggvény becslése



A testmagasság hisztogramja  $n = 96$  elemű mintából (valós adatokból), a sűrűségfüggvény becslése Gauss-magfüggvénnyel.

## A sűrűségfüggvény becslése

$X_1, X_2, \dots, X_n$  független azonos eloszlású abszolút folytonos minta. A sűrűségfüggvény  $f$ , azaz

$$\mathbb{P}(a \leq X_1 \leq b) = \int_a^b f(t) dt \quad \text{minden } a < b\text{-re.}$$


Az  $f$  függvény ismeretlen. Hogyan tudjuk  $f(t)$  értékét becsülni az  $X_1, \dots, X_n$  megfigyelések segítségével?

Hisztogram:

$$\mathbb{P}(a \leq X_1 \leq b) = \int_a^b f(t) dt \approx \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{I}(a < X_j \leq b),$$

azaz a becslés  $a$  és  $b$  közé eső mintaelemek aránya.


# A sűrűségfüggvény becslése téglalapos magfüggvénnyel



Minta  $(X_1, \dots, X_7)$ : 1, 3, 3, 6, 8, 8, 8. **Téglalap magfüggvény**:  $k(y) = 1/2$ , ha  $-1 \leq y \leq 1$ , nulla különben, azaz  $k(y) = \frac{1}{2}\mathbb{I}(|y| \leq 1)$  és  $h$  az **ablakszélesség**.

$$\hat{f}_n(t) = \frac{1}{n \cdot h} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{t - X_j}{h}\right) = \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \mathbb{I}(|t - X_j| < h).$$


# A sűrűségfüggvény becslése háromszöges magfüggvénnyel



Minta  $(X_1, \dots, X_7)$ : 1, 3, 3, 6, 8, 8, 8. **Háromszöges magfüggvény**:  $k(y) = \max(1 - |y|, 0)$  és  $h = 1/2$  az ablakszélesség.

$$\hat{f}_n(t) = \frac{1}{n \cdot h} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{t - X_j}{h}\right).$$


# A sűrűségfüggvény becslése Gauss-magfüggvénnyel



Minta ( $X$ ): 1, 3, 3, 6, 8, 8, 8. **Gauss-magfüggvény:**  $k(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-y^2/2)$  és  $h = 1/2$  az ablakszélesség.

$$\hat{f}_n(t) = \frac{1}{n \cdot h} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{t - X_j}{h}\right) = \frac{1}{n \cdot h \cdot \sqrt{2\pi}} \sum_{j=1}^n \exp\left(-\frac{(y - X_j)^2}{2h^2}\right).$$

# A sűrűségfüggvény becslése Gauss-magfüggvénnyel



Minta ( $X$ ): 1, 3, 3, 6, 8, 8, 8. Gauss-magfüggvény:  $k(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-y^2/2)$  és  $h = 2$  **az ablakszélesség**.

$$\hat{f}_n(t) = \frac{1}{n \cdot h} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{t - X_j}{h}\right) = \frac{1}{n \cdot h \cdot \sqrt{2\pi}} \sum_{j=1}^n \exp\left(-\frac{(y - X_j)^2}{2 \cdot 2^2}\right).$$

## Parzen–Rosenblatt-becslés

Legyen  $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  olyan függvény, mely korlátos,  $\lim_{y \rightarrow \infty} yk(y) = 0$ , továbbá  $h_n$  olyan számsorozat, melyre  $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$  és  $\lim_{n \rightarrow \infty} nh_n = \infty$ . A sűrűségfüggvény becslése a  $t$  pontban a Parzen–Rosenblatt-módszerrel a  $k$  magfüggvénnyel és  $h_n$  sávszélességgel az  $X_1, \dots, X_n$  független minta alapján:

$$\hat{f}_n(t) = \frac{1}{n \cdot h_n} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{t - X_j}{h_n}\right).$$

## Parzen–Rosenblatt-becslés

Legyen  $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  olyan függvény, mely korlátos,  $\lim_{y \rightarrow \infty} yk(y) = 0$ , továbbá  $h_n$  olyan számsorozat, melyre  $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$  és  $\lim_{n \rightarrow \infty} nh_n = \infty$ . A sűrűségfüggvény becslése a  $t$  pontban a Parzen–Rosenblatt-módszerrel a  $k$  magfüggvénnyel és  $h_n$  sávszélességgel az  $X_1, \dots, X_n$  független minta alapján:

$$\hat{f}_n(t) = \frac{1}{n \cdot h_n} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{t - X_j}{h_n}\right).$$

Megfelelő feltételek mellett  $\hat{f}_n(t) \rightarrow f(t)$  minden  $t$ -re, ha  $n \rightarrow \infty$ . Szokásos magfüggvények például:

- Gauss-magfüggvény:  $k(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-y^2/2)$ .
- Háromszög magfüggvény:  $k(y) = (1 - |y|)$ , ha ez nemnegatív, nulla különben.
- Epanechnikov-magfüggvény:  $k(y) = \frac{3}{4}(1 - y^2)$ , ha ez nemnegatív, nulla különben.
- Téglalap magfüggvény:  $k(y) = 1/2$ , ha  $-1 \leq y \leq 1$ , nulla különben.

## Parzen–Rosenblatt-becslés

A sűrűségfüggvény becslése a  $t$  pontban a Parzen–Rosenblatt-módszerrel a  $k$  magfüggvénnyel és  $h_n$  sáv szélességgel az  $X_1, \dots, X_n$  független minta alapján:

$$\hat{f}_n(t) = \frac{1}{n \cdot h_n} \sum_{j=1}^n k\left(\frac{t - X_j}{h_n}\right).$$


Szokásos sáv szélesség-választások (normális eloszlás és Gauss-magfüggvény esetén az első optimális), ezekre  $h_n \rightarrow 0$ , de  $nh_n \rightarrow \infty$ :

$$h_n = 0,7 \cdot \frac{s_n^*}{n^{1/5}}; \quad h_n = 0,7 \cdot \frac{\min(s_n^*, q)}{n^{1/5}},$$

ahol  $s_n^*$  a korrigált tapasztalati szórás,  $q$  a harmadik és első kvartilis távolsága.

Ugyanúgy, mint a hisztogramnál, a túl nagy sáv szélesség túl kevésbé részletes ábrához, a túl kicsi sáv szélesség túl részletes ábrához vezet.

# Hisztogram és sűrűségfüggvény becslése




A testmagasság histogramja  $n = 96$  elemű mintából (valós adatokból), háromszöges (piros) és téglalapos (fekete) magfüggvénnyel (ez utóbbihoz túl kicsi a sávszélesség).

## Testmagasság sűrűségfüggvényének becslése

```
> testmagassag <- c(186, 180, 197, 191, 181, 178, 193, 177, 167, 163, 164, 170, 178)
> hist(testmagassag, col="#76a8f7", xlab="cm", ylab="gyakoriság",
main="Testmagasság hisztogramja", breaks=12, prob=TRUE)
> legend("topleft", c("n: 96", "átlag: 174,8", "szórás: 10,5"),
bty="n")
> lines(density(testmagassag, kernel="triangular", adjust=1/3),
lwd="4", col="black")
> lines(density(testmagassag, kernel="rectangular", adjust=3),
lwd="4", col="blue")
> lines(density(testmagassag, kernel="epanechnikov"),
lwd="4", col="red")
> legend("topright", c("triangular", "rectangular", "Epanechnikov")
col=c("black", "blue", "red"), lwd="3", bty="o")
```

# Testmagasság sűrűségfüggvényének becslése



Testmagasság sűrűségfüggvényének becslése: háromszöges magfüggvény 1/3-szoros sávszélességgel (fekete), téglalapos magfüggvény 3-szoros sávszélességgel (kék), Epanechnikov-magfüggvény alapértelmezett sávszélességgel (piros)

# Indexek számítása

Egy időben változó mennyiség egy időszakban (tárgyidőszakban) mért értékeit szeretnénk egy korábbi, hasonló időszakban (bázisidőszakban) mért értékekkel összehasonlítani, hogy az átlagos változást leírhassuk. Például tekinthetjük a fogyasztói árindexet (például: [https://www.ksh.hu/stadat\\_files/ara/hu/ara0040.html](https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0040.html), vagy [http://www.ksh.hu/interaktiv/fogyar\\_radar/index.html](http://www.ksh.hu/interaktiv/fogyar_radar/index.html)).

Tegyük fel, hogy az árindexbe az  $1, 2, \dots, n$  termékek forgalmát építik be. Legyen

- $q_{0,j}$  a  $j$ . termékből eladott mennyiség a bázisidőszakban;
- $q_{1,j}$  a  $j$ . termékből eladott mennyiség a tárgyidőszakban;
- $p_{0,j}$  a  $j$ . termék egységára a bázisidőszakban;
- $p_{1,j}$  a  $j$ . termék egységára a tárgyidőszakban.

## Árindexek számítása

Tegyük fel, hogy az árindexbe az  $1, 2, \dots, n$  termékek forgalmát építik be. Legyen

- $q_{0,j}$  a  $j$ . termékből eladott mennyiség a bázisidőszakban;
- $q_{1,j}$  a  $j$ . termékből eladott mennyiség a tárgyidőszakban;
- $p_{0,j}$  a  $j$ . termék egységára a bázisidőszakban;
- $p_{1,j}$  a  $j$ . termék egységára a tárgyidőszakban.

**Bázisidőszaki súlyozású vagy Laspeyres-féle árindex:** annak hányadosa, hogy az új árakkal, de a bázisidőszak fogyasztásával mennyivel nőtt az összes kiadás a régebbi időszakhoz képest, azaz

$$\frac{\sum_{j=1}^n q_{0,j} p_{1,j}}{\sum_{j=1}^n q_{0,j} p_{0,j}}$$

**Tárgyidőszaki súlyozású vagy Paasche-féle árindex:** annak hányadosa, hogy az új árakkal és az új fogyasztással mennyivel nőtt az összes kiadás, azaz

$$\frac{\sum_{j=1}^n q_{1,j} p_{1,j}}{\sum_{j=1}^n q_{1,j} p_{0,j}}$$

## Volumenindexek számítása

Tegyük fel, hogy az árindexbe az  $1, 2, \dots, n$  termékek forgalmát építik be. Legyen

- $q_{0,j}$  a  $j$ . termékből eladott mennyiség a bázisidőszakban;
- $q_{1,j}$  a  $j$ . termékből eladott mennyiség a tárgyidőszakban;
- $p_{0,j}$  a  $j$ . termék egységára a bázisidőszakban;
- $p_{1,j}$  a  $j$ . termék egységára a tárgyidőszakban.


**Bázisidőszaki súlyozású vagy Laspeyres-féle volumenindex:** a régi árakkal számolva hányszorosára nőtt az összes kiadás, azaz

$$\frac{\sum_{j=1}^n q_{1,j} p_{0,j}}{\sum_{j=1}^n q_{0,j} p_{0,j}}$$

**Tárgyidőszaki súlyozású vagy Paasche-féle volumenindex:** az új árakkal számolva hányszorosára nőtt az összes kiadás, azaz


$$\frac{\sum_{j=1}^n q_{1,j} p_{1,j}}{\sum_{j=1}^n q_{0,j} p_{1,j}}$$

# Poisson-eloszlás paraméterének becslése



A gólok számának hisztogramja  $n = 95$  mérkőzésen, és különböző paraméterű Poisson-eloszlások ( $\mathbb{P}_\lambda(X = k) = \lambda^k / k! \cdot e^{-\lambda}$ ).  $\lambda = 1,375$  a gólok átlagos száma.


# Az exponenciális eloszlású minta hisztogramja



Exponenciális eloszlású minta hisztogramja és sűrűségfüggvénye:


$$f(x) = \lambda \exp(-\lambda x) \mathbb{I}(x > 0); \quad \mathbb{E}(X) = D(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

# Exponenciális eloszlás



$\lambda = 0,5$  paraméterű exponenciális eloszlást generálva a mintaátlag reciproka  $0,5$ -höz tart, azaz **konzisztens** becslés, hiszen ez minden  $\lambda$ -ra teljesül.

# Exponenciális eloszlás



$\lambda = 1$  paraméterű exponenciális eloszlást generálva a mintaátlag reciproka 1-hez tart, azaz **konzisztens** becslés, hiszen ez minden  $\lambda$ -ra teljesül.

## Házi feladat február 25., kedd, 10:15-ig

A házi feladathoz gyűjtött adatok alapján készítsük el a sorozatnézéssel töltött idő sűrűségfüggvényének becslését három különböző magfüggvénnyel. Milyen következtetést vonhatunk le az ábrá(k)ról?